MODO DE EMPLEO

PASTA Y GEL DENTÍFRICOS
Después de cada comida, realizar la higiene bucal con el gel dentífrico o la pasta dentífrica SensiLacer y el cepillo LACER Technic Extrasuave, cepillando desde la encía hasta el extremo del diente. Tras el cepillado, SensiLacer proporciona una agradable sensación de frescor y limpieza en la boca.

COLUTORIO
Después del cepillado dental, realizar un enjuague bucal 2-3 veces al día con 10 ml de SensiLacer colutorio sin diluir, dejando que el líquido circule por toda la cavidad oral durante 1 minuto. Para conseguir la máxima eficacia desensibilizante, es aconsejable no enjuagarse con agua ni ingerir bebidas o alimentos hasta transcurridos unos 15 minutos después de realizar el enjuague. No ingerir.

GEL BIOADHESIVO
Aplicar el gel directamente sobre los dientes afectados con la ayuda del dedo o de la cánula. Masajee suavemente con la yema de los dedos para favorecer la adhesión del gel, de manera que forme una fina película protectora sobre el diente. El gel bioadhesivo debe aplicarse 2 ó 3 veces al día, después de una correcta higiene bucal, y se recomienda no ingerir ningún líquido ni alimento hasta pasada media hora desde su utilización. No enjuagar después de su aplicación. No ingerir. No utilizar durante más de 7 días sin consultar con el odontólogo.